

**PREMEDICAZIONE per ESAMI DIAGNOSTICI con MDC ENDOVENOSI**

Protocollo di premedicazione per Pazienti allergici, che devono eseguire esami diagnostici che prevedono l'introduzione endovenosa di mezzi di contrasto (secondo Documento di Consenso SIRM-SIAAIC Gestione dei Pazienti a Rischio di Reazione Avversa a Mezzo di Contrasto – Aprile 2018)

**Modulo da riconsegnare al medico radiologo il giorno dell'esame**

Nome e Cognome del Paziente \_\_\_\_\_

**Angioedema / Mastocitosi / Anafilassi Idiopatica**

- Prednisone 25 mg :
  - 2 compresse da assumere 12 ore prima dell'esame;
  - 2 compresse da assumere 2 ore prima dell'esame;
- Cetirizina:
  - 1 compressa da 10 mg da assumere 1 ora prima dell'esame.

**Reazione avversa al MDC:**

- Predisone 25 mg :
  - 2 compresse da assumere 13 ore prima dell'esame;
  - 2 compresse da assumere 7 ore prima dell'esame;
  - 2 compresse da assumere 1 ora prima dell'esame;
- Cetirizina:
  - 1 compressa da 10 mg da assumere 1 ora prima dell'esame.

**N.B.:** Da valutare insieme al Medico Curante l'opportunità di assumere un gastroprotettore

Gubbio, lì \_\_\_\_\_ Il Medico \_\_\_\_\_



Il/La Paziente attesta di aver assunto la terapia prescritta come da protocollo sopra riportato.  
La preparazione farmacologica non previene in via assoluta i rischi, ma ne riduce l'intensità.

Gubbio, lì \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_